

$\delta X = X - X_0$	$X_0 \in \langle X - \Delta X, X + \Delta X \rangle$	$\bar{T} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_n}{n}$	$s_T = \sqrt{\frac{(T_1 - \bar{T})^2 + (T_2 - \bar{T})^2 + \dots + (T_n - \bar{T})^2}{n - 1}}$
$s_{\bar{T}} = \frac{s_T}{\sqrt{n}}$	$F = f(A_1, A_2, \dots, A_m)$		$\Delta F = \pm \sum_{i=1}^m \left  \frac{\partial f(A_1, A_2, \dots, A_m)}{\partial A_i} \right  \cdot  \Delta A_i $
$F = const \cdot A^a \cdot B^b \cdot C^c \dots$		$\Delta F = \pm F \cdot \left[ \left  a \cdot \frac{\Delta A}{A} \right  + \left  b \cdot \frac{\Delta B}{B} \right  + \left  c \cdot \frac{\Delta C}{C} \right  + \dots \right]$	

$y(x, t) = A \cdot \sin \left[ \omega \cdot \left( t - \frac{x}{v_{fali}} \right) \right] = A \cdot \sin \left[ 2 \cdot \pi \cdot \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{T \cdot v_{fali}} \right) \right] = A \cdot \sin \left[ 2 \cdot \pi \cdot \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right] = A \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x)$				
$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$	$k = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda}$	$\lambda = v_{fali} \cdot T$	$I = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S}$	$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot R^2}$
$v_{fali} = \sqrt{\frac{F_n}{\mu}}$	$v_{fali} = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$	$d = n \cdot \lambda$	$d = (2 \cdot n + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$	$L = \frac{1}{4} \cdot \lambda = \frac{1}{4} \cdot \frac{v_{fali}}{f}$
$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{v_\alpha}{v_\beta} = \frac{\lambda_\alpha}{\lambda_\beta} = const$	$\frac{v_\alpha}{\lambda_\alpha} = \frac{v_\beta}{\lambda_\beta} = f = const$	$L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$	$f' = f \cdot \frac{v_{dz} \pm v_{ob}}{v_{dz} \mp v_{zr}}$	

$\frac{dn}{dt} = -D \cdot S \cdot \frac{dc}{dx}$	$D = \frac{k \cdot T}{6 \cdot \pi \cdot r \cdot \eta}$	$\overline{\Delta x^2} = 2 \cdot D \cdot t$	$P = \frac{D}{dx}$	
$\frac{dn}{dt} = P \cdot S \cdot (c_1 - c_2)$	$c_2 = \frac{c_0}{2} \cdot (1 - e^{-C \cdot D \cdot t})$	$C = \frac{2 \cdot A}{V \cdot dx}$	$\ln\left(\frac{c_0}{c_0 - 2 \cdot c_2}\right) = C \cdot D \cdot t$	
$\pi = f \cdot c_m \cdot R \cdot T$	$\mu_i = \left(\frac{\partial G_i}{\partial n_i}\right)_{T, p, n_j \text{ dla } j \neq i}$	$H = U + p \cdot V$	$G = H - T \cdot S$	$F = U - T \cdot S$

$W = \sigma \cdot \Delta S$	$\sigma = \frac{F}{l}$	$\sigma = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{2 \cdot \pi \cdot r \cdot n}$	$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{n_0 \cdot \rho}{n \cdot \rho_0}$	$\sigma = \frac{r \cdot h \cdot \rho \cdot g}{2 \cdot \cos(\alpha)}$	$\Delta p = \frac{2 \cdot \sigma}{R}$
-----------------------------	------------------------	---	---	--	---------------------------------------

$F = \eta \cdot S \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x}$	$R = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot v \cdot \eta$	$\Delta V = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta t}{8 \cdot l \cdot \eta} \cdot \Delta p$	$\eta = \frac{2 \cdot r^2 \cdot g \cdot (\rho - \rho_c)}{9 \cdot v}$
$\eta_{wt} = \frac{\eta}{\eta_0} - 1$	$[\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \left( \frac{\eta_{wt}}{c} \right)$	$\frac{\eta}{\eta_0} = 1 + 2,5 \cdot \Phi$	$[\eta] = 2,5 \cdot \frac{N_A}{M} \cdot v_{cz}$
$r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot M}{10 \cdot \pi \cdot N_A} \cdot [\eta]}$	$\frac{\eta}{\eta_0} = \frac{t}{t_0} \cdot \frac{\rho}{\rho_0}$	$\frac{\rho}{\rho_0} = 1 + 0,23 \cdot c$	

$E = E_{el} + E_{osc} + E_{rot}$	$h \cdot \nu = E_2 - E_1 = \Delta E_{el} + \Delta E_{osc} + \Delta E_{rot}$	$P = P_0 \cdot e^{-k \cdot d}$	$k = a_\lambda \cdot c$	
$P = P_0 \cdot e^{-a_\lambda \cdot c \cdot d}$	$\tau = \frac{P}{P_0}$	$\tau = e^{-a_\lambda \cdot c \cdot d}$	$A = -\log(\tau)$	$\varepsilon_\lambda = a_\lambda \cdot \log(e)$

$T = \frac{1}{f}$	$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$	$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$	$v(t) = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$
$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = -\omega^2 \cdot x(t)$		$F_{wyp}(t) = m \cdot a(t) = -m \cdot A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = - \underbrace{k}_{m \cdot \omega^2} \cdot x(t)$	
$F_{wyp}(t) = -k \cdot x(t)$			

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$	$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}$	$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{I}{m \cdot g \cdot h}}$
$E_{Kinetyczna} = \frac{m \cdot v^2}{2} = \underbrace{\frac{m}{2} \cdot A^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t + \varphi)}_{E_{Kin Maks}}$		$E_{Potencjalna} = \frac{m}{2} \cdot A^2 \cdot \omega^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t + \varphi)$ $E_{Pot Maks}$	
$A(t) = A \cdot e^{-\delta \cdot t}$	$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \delta^2}$	$\omega_{wym} = \omega$	$g = 4 \cdot \pi^2 \cdot \frac{\ell}{T^2}$

$p = \frac{F}{S}$	$\rho = \frac{m}{V}$	$\gamma = \frac{m \cdot g}{V}$	$p = \rho \cdot g \cdot h$
$F_{parcia} = p \cdot S = S \cdot \rho \cdot g \cdot h$		$F_{wyporu} = V_{zanurzonej Cz\acute{e}ści} \cdot \rho_{cieczy} \cdot g$	

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	$C = m \cdot c$	$\Phi = \Phi_K + \Phi_R + \Phi_P + \Phi_T$
$\Phi_K = \alpha \cdot S \cdot (T_c - T_o)$	$\Phi_R = \sigma \cdot \varepsilon \cdot S \cdot (T_c^4 - T_o^4)$	$\Phi_P = k \cdot S \cdot (p_s - p_o)$
$\Phi_T = -\lambda \cdot S \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x}$	$L(T) = L \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$	$\alpha = \frac{\Delta L}{L \cdot \Delta T}$
$h = \frac{\lambda}{c \cdot \rho}$	$\Delta U = Q^\downarrow + W^\downarrow$	

$Q = m \cdot c_{wl} \cdot \Delta T$	$c_{wl} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$	$Q = m \cdot C_{faz}$	$C_{faz} = \frac{Q}{m}$
$W^\downarrow = -p \cdot \Delta V$	$\Delta U = Q^\downarrow + W^\downarrow$		

Wartości wybranych stałych fizycznych:

Liczba Avogadro .....  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$   
Stała gazowa .....  $R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$   
Stała Boltzmanna .....  $k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$   
Ładunek elektronu .....  $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{C}$   
Masa spoczynkowa elektronu .....  $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{kg}$   
Stała Faradaya .....  $F = e \cdot N_A = 96500 \frac{\text{C}}{\text{mol}}$   
Przyspieszenie ziemskie .....  $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$   
Podstawa logarytmu naturalnego .....  $e \approx 2,72$   
Przenikalność magnetyczna próżni ..  $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}}$   
Przenikalność elektryczna próżni ..  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$

Pi .....  $\pi \approx 3,14$   
Stała Plancka .....  $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$   
Prędkość światła w próżni .....  $c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$   
Prędkość dźwięku w powietrzu .....  $v_d = 331 \frac{\text{m}}{\text{s}}$   
Stała Stefana-Boltzmanna .....  $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{K}^4 \cdot \text{m}^2}$   
Stała Wiena .....  $b = 2,90 \cdot 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$   
Progowe natężenie dźwięku dla 1 kHz .....  $10^{-12} \text{W/m}^2$   
Progowe ciśnienie akustyczne dla 1 kHz .....  $2 \cdot 10^{-5} \text{Pa}$   
Elektronowolt .....  $1 \text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{J}$